

予防接種を計画的に受けましょう!

予防接種が変わってきています。今回はその内容をお伝えしようと思います。

- ・不活化ポリオ(単独)・4種混合・3種混合について
平成24年9月から生ポリオワクチンの集団接種は中止になり、不活化ポリオになっています。3種混合ワクチン(ジフテリア・百日咳・破傷風)は今まで通りありますが、新しい4種混合ワクチン(3種+不活化ポリオ)が始まっています。これまでの接種歴によって異なりますので、確認が大切です。
- ・麻疹(はしか)・風疹(三日ばしか)・日本脳炎・ヒブ・小児用肺炎球菌・BCGの予防接種も知らせておきますので、計画してください。

種類		対象・回数
不活化ポリオ (単独)	初回	生後3ヶ月～90ヶ月未満に20日から56日までの間隔をおいて3回受ける。 できるだけ生後3ヶ月～1歳未満の間に受けてください。
	初回追加	1期初回終了後、6ヶ月以上(標準的には12～18ヶ月)の間隔をおいて1回受ける。90ヶ月未満が対象です。
3種混合 (ジフテリア・百日咳・破傷風)	1期初回	生後3ヶ月～90ヶ月未満に20日から56日までの間隔をおいて3回受ける。 できるだけ生後3ヶ月から1歳未満の間に受けてください。
	1期初回追加	1期初回終了後、6ヶ月以上(標準的には12～18ヶ月)の間隔をおいて1回受ける。90ヶ月未満が対象です。
4種混合 (ジフテリア・百日咳・破傷風・ 不活化ポリオ)	1期初回	生後3ヶ月～90ヶ月未満に20日から56日までの間隔をおいて3回受ける。 できるだけ生後3ヶ月から1歳未満の間に受けてください。
	1期初回追加	1期初回終了後、6ヶ月以上(標準的には12～18ヶ月)の間隔をおいて1回受ける。90ヶ月未満が対象です。
BCG	—	生後3ヶ月～12ヶ月未満の間に1回受ける。 できるだけ5～8ヶ月にうけてください。
ヒブ (インフルエンザ菌b型)	—	生後2ヵ月～60ヶ月未満。接種開始月齢により接種回数異なります。 医師に相談してください。
小児用肺炎球菌	—	生後2ヵ月～60ヶ月未満。接種開始月齢により接種回数異なります。 医師に相談してください。
日本脳炎	1期初回	生後6ヶ月～90ヶ月未満に6日から28日の間隔をおいて2回受ける。 (なるべく3歳で受ける)
	1期追加	1期初回終了後概ね1年おいて1回受ける。(なるべく4歳で受ける)
	2期	満9歳～13歳未満で1回受ける。(なるべく小学校4年生で受ける)
麻疹(はしか)・ 風疹(三日ばしか)	1期	満12ヶ月～24ヶ月未満の間に1回受ける。 (なるべく満1歳になると受けるようにしてください)
	2期	満5歳以上7歳未満で小学校就学の前日(3月31日)までに1回受ける。